



GELECEĞİ
BİLİM
İLE
YEŞERTİYORUZ


ÜRÜN KATALOĞU

GELECEĞİ
BİLİM
İLE
YEŞERTİYORUZ



HAKKIMIZDA





Verimlilikte Gelenek, Kalitede Yenilik!

Alaçatı Tarım, 2007 yılında İzmir’de kurulan bir şirket olarak bitki besleme ürünleri üretme sektörüne adım atmıştır. Hedefimiz tarımda gelişen teknolojiyi doğayı koruyarak çiftçilere daha etkili ve çevre dostu çözümler sunmaktır. Alaçatı tarım olarak, çiftçilere inovatif ürünlerle hizmet vererek sadece ülke sınırlarında değil, dünya çiftçilerine de katkı sağlamaktayız. Sahip olduğumuz deneyimli teknik ekibimiz sayesinde, ürünlerin uygun dozlarda ve zamanında kullanımını sağlayarak sahadan gelen talepleri dikkate alıyor ve üretim ile Ar-Ge Tçalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Ayrıca, sektördeki diğer firmaÅlara danışmanlık hizmeti sunarak üretim tesisleri kurma ve ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarında destek oluyoruz.

Alaçatı Tarım, tarım sektöründe öncü bir rol üstlenmeye devam etmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik spesifik çözümler sunmayı hedefleyen şirketimiz, zengin ürün portföyüyle kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Yenilikçi ürünlerimizle çiftçilerin verimliliğini artırarak tarım alanında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyoruz. Doğanın korunması ve sorumluluk alınması bilinciyle hareket ediyor, sektördeki liderliğimizi sürdürmeye ve tarım dünyasına değer katma misyonumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam ediyoruz.



Sayfa İerikleri

➤ **1-8 Organik ve Organomineral Gbreler**

İnorganik Sıvı Gbreler 9-18 ➤

➤ **19-24 Jel Ve Sspansiyon Gbreleri**

Damlama Sulama Gbreleri 25-32 ➤



Sayfa İerikleri

 **33-40 Yaprak Gbreleri**

zel Gbreler 41-44 





Organik ve Organomineral Gübreler

GELECEĞİ
BİLİM
İLE
YEŞERTİYORUZ





www.alacatitarim.com

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Organik Madde	%30
Organik Karbon	%13
Organik Azot	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	%1,3
Serbest Aminoasit	%8
pH	3-5

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

BioPOWER; yüksek oranda Organik Madde, Organik Karbon, Organik Azot, Potasyum'un yanında farmakolojik saflıkta Gamma Amino Butyric Acid (GABA), Glutamik asit, Prolin, Mannitol gibi, bitkinin gelişmesinde ve kuvvetlenmesinde tetikleyici rol oynayan bitkisel kökenli amino asitler içeren özel hazırlanmış çevre dostu, ekolojik, sıvı mükemmel bir üründür.

Bitkilerde Gamma Amino Butyric Acid (GABA), varlığı ilk olarak 1940'ların sonunda Cornell Üniversitesinde keşfedildi. Stres dönemlerinde GABA değerlerinin yüksektiği gözlemlendi. Yapılan araştırmalar GABA döngüsünün bitkilerin strese yanıt verebilmesi için gerekli olduğunu gösterdi.

GABA döngüsünün sağlıklı bitkilerde harekete geçirilmesinin, bitki fizyolojisini güçlendireceği, performansı ve strese dayanıklılığı artıracak olduğu düşünüldü. İlk başlarda doğrudan GABA uygulaması yoluyla yapılan denemeler başarısız oldu çünkü hemen bozulan GABA çok az veya hiç etki göstermiyordu.

1990'ların ortasında strese olmayan sağlıklı bir bitkinin GABA döngüsünü nasıl tetikleneceği keşfedildi.

Bitkiler strese girdiğinde veya metabolik etkinliklerinin arttığı dönemlerde (çiçeklenme dönemi, meyve oluşum dönemi, meyve irileştirme ve renklenme dönemi gibi) bünyelerindeki GABA oranı belirgin şekilde artar.

BioPOWER, kullanıldığı bitkilerde GABA miktarının artmasını sağlar.

BioPOWER;

- o Bitkilerde çiçeklenmeyi artırır.
- o Yeri değiştirilen bitkilerin adaptasyon sürelerini kısaltır.
- o Büyüme uçlarını uyarır (Sürgün ve saçak kökleri).
- o Aşırı yağış, kuraklık, rüzgar, dolu gibi stres koşullarında bitkilerin yaşam güçleri ve dirençleri artar.
- o Bitkiler ezilme ve mekanik zararlara karşı direnç kazanırlar.
- o Sıcak soğuk değişimlerinde bitkilerin dayanımları artar.

İlaçlar, gübreler ve gelişim düzenleyiciler ile aynı tank içerisinde karıştırılabilir.

**KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:**

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	DAMLA SULAMA İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 lt. Suya
Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Dikimden 10 gün sonra damla sulama ile 1-2 uygulama. Yapraktan Çiçeklenme öncesinden itibaren ihtiyaç duyulan her dönem ve sıklıkta.	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Tüm Açık Alan ve Kışlık Sebzeleri	Dikimden 10 gün sonra damla sulama ile 1-2 uygulama. Yapraktan Çiçeklenme öncesinden itibaren ihtiyaç duyulan her dönem ve sıklıkta.	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Kavun, Karpuz, Kabak ve Karnıbahar.	Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 2-3 uygulama	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Patates , Soğan , Turp Havuç, Sarımsak.	Dikimden olgunlaşma başlangıcına kadar 2-3 uygulama	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Çilek	Vegetatif dönemden itibaren 3-4 uygulama	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Bağ	Damla sulama ile Sürgün başlangıcından itibaren ihtiyaç uyulan her dönem Yaprak'tan uygulama Meyve bağlama dönemine kadar ihtiyaç duyulan sıklıkta.	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Mısır, Ayçiçeği.	1*Çıkıştan 15 gün sonra uygulanır. 2*Bitki boyu 60-70 cm iken.	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Muz	Doğumdan 30-45 gün önceden (Nisan-Mayıs) itibaren 2-3 uygulama	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Hububat ve yem bitkileri.	Erken ilkbaharda kardeşlenme dönemi.	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem Fındık, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.s	Çiçeklenme başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönem ve sıklıkta.	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Pamuk	8-10 yapraklı dönemden itibaren ihtiyaç duyulan her dönemde güvenle kullanılabilir.	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Zeytin , İncir ve Narenciye	Çiçeklenme öncesinden, itibaren 2-3 uygulama	1-2 lt/Da.	100-150 cc.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Organik Madde	%15
Algirik Asit	%0,4
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	%1
EC(dS/m) %	%7,13
pH	6-8

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARİ

Bitkisel Kökenli phytohormonlar İçeren Tamamen Doğal Olan Bir Üründür.

OBELL-X,kullanıldığı bitkilerde dikine hücre bölünmesini arttıran özel bir üründür. OBELL-X,özellikle meyvesini irileştirmek ve görüntü kalitesini arttırmak istediğiniz tüm ürünlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.

OBELL-X,saf deniz yosunu konsantresi , CYTOQUININES ,AUXIN,GIBBERELÂ LINS,CPPU gibi bitkisel menşeden elde edilen phytohormonlar açısından oldukça zengindir.

OBELL-X,meyve tutumundan sonra meyve irileştirme dönem başlangıcında uygulanmaya başlanır. 1- 2 uygulama yeterli sonuçlar almanız açısından yeterlidir.

OBELL-X,bitkinin besin maddelerinden daha etkin faydalanmasını sağlar

OBELL-X,uygulamalarınızdan sonra ürününüzü sulama imkanınız var ise daha hızlı ve katii sonuçlar almanız açısında uygulama sonrası, sulama yapmanız faydalıdır.

İlaçlar, gübreler ve gelişim düzenleyiciler ile aynı tank içerisinde karıştırılabilir. Yakıcılığı yoktur.





KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU:

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TO PRAKTAN UYGULAMA Damlama Sulama ile	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 lt. suya
Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Mey ve Tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc
Tüm Açık Alan ve Kışlık Sebzeleri	Mey ve Tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc
Kavun, Karpuz, Kabak ve Karnabahar	Mey ve Tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc
Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak	İlk çapadan, olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc
Çilek, Kivi	Mey ve Tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc
Bağ	Mey ve Tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc
Fındık	Mey ve Tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.s	Mey ve Tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc
Pamuk	Koza tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	150-200 cc
Zeytin, İncir ve Narenciye	Mey ve Tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-1,5 lt / Da	100-150 cc

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Organik Madde	%25
Toplam Azot	%6
Organik Azot	%0,5
Üre Azotu	%5,5
Toplam Fosfor Pentaoksit(P2O5)	%6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)	%5,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)	%6
Suda Çözünür Bor(B)	%0,5
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,5
Serbest Aminoasit	%4
Maksimum Klor	%5
pH	6-8

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI


Toprağınızın organik madde miktarı çok önemlidir. Tarımın yapılabilmesi için toprağınızda hacimsel olarak yaklaşık % 12 Organik Madde bulunmalıdır. Toprak organik maddesi, toprak partiküllerini bir araya bağlayarak büyük agregat

oluşumunu sağlar ve toprakta boşluk oranı artar. Bu sayede toprak içinde hava ve su hareketi kolaylaşır. Organik maddenin yetersiz olduğu durumda, toprak agregatlarının istabilitesi bozulur, yağış ve sulamalarla agregatlar parçalanır, büyük porlar kaybolur, toprak havası azalır, su hareketi azalır, toprak sıkışır ve volüm ağırlığı artar. Yoğun işlenen topraklarda organik madde azalır ve toprağın fiziksel yapısı bozulur. Dolayısı ile yoğun tarım yapılan toprağınıza her yıl organik madde takviyesi yapmalısınız. Hi-Prom, Yaş bitkilerden elde edilmiş, amino asitlerce zengin özel bir üründür. Toprağa verilen azot miktarının bitkiye dengeli bir biçimde dağıtır. Toprakta bulunan tuzu bitkinin kök kısmından uzaklaştırarak bitkiye zarar vermesini engeller. Bitkiler de köklenmeye karşı direkt etkilere sahiptir. Çok yıllık bitkilerde bitki özsuyu hareketi ile kullanılmaya başlanması uygundur. Tek yıllık bitkilerde fide dikimi ile 3-5 yapraklı dönemden itibaren güvenle kullanılabilir.

Yeşil bitkilerde klorofil miktarını artırır. Güçlü fiziksel darbelerle dayanıklı koyu yeşil renkli yaprakların oluşmasını sağlar. Çim ve yeşil alanlarda ezilme ve basılma gibi zorlu fiziksel şartlarda bitkilerin dayanımını artırır. Özel formülasyonu sayesinde erken yaşlanmanın önüne geçilir. Sürgün faaliyetini ve yeniden filizlenmeyi artırır. Gelişme durgunluğu görülen bitkilerde güvenle kullanılır. Suyun eritemediği kireci eritir ve eritme sonucu çıkan karbondioksit fotosentezde kullanılır. Toprakta bulunan bitki gelişimi için gerekli olan demiri bitkinin alabileceği şekle dönüştürür. Hi-Prom bitkide hücre bölünmesini artırarak bitkinin büyüme hızını artırır. Hi-Prom, Olumsuz çevre şartlarına karşı (Toprak tuzluluğu, Sıcak, Soğuk, su sitesi...vb.) bitkilerin direncini artırır. Yetiştirilen bitki suya daha az gereksinim duyar. Sulama konusunda gereksiz su harcamasının önüne geçilir. Organik gübre toprağın rengini koyulaştırarak toprağın daha fazla güneş ışığını emmesi sağlar. Toprağın geçirgenliğini artırarak hava ve su alımını kolaylaştırır.

Hi-Prom, Bütün bitki sağlığı ürünleri, gelişim düzenleyicileri ve gübreler ile karışım halinde güvenle kullanılır. Alkali ürünlerle, yağ, sülfür, bakır ve bakırlı ürünlerle karıştırmayınız. Karışım öncesi test edilmesi tavsiye edilir.

İlaçlar, gübreler ve gelişim düzenleyiciler ile aynı tank içerisinde karıştırılabilir. Yakıcılığı yoktur.



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	DAMLA SULAMA İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 lt. Suya
Tüm sebzelerde	Dikimden 15-20 gün sonra ve 20 gün arayla tüm üretim periyodu süresince	1-2 lt/Da.	200-250 cc.
Meyve ağaçları(elma,armut,kayısı ,şeftali vb.)	Çiçeklenme öncesinde,Haziran dökümleri öncesinde ve Meyvede şeker oluşumu başlamadan	1-2 lt/Da.	150-200 cc.
Kavun, Karpuz	1.Uygulama:Kol atma dönemi 2. Uygulama:Çiçeklenme öncesi 3.Uygulama:Meyve irileşme döneminde 15 gün arayla gerekli görüldüğünde	1-2 lt/Da.	150-200 cc.
Patates , Soğan	5-6 yaprak dönemi ve baş büyüme döneminde	1-2 lt/Da.	100-150 cc.
Çeltik	Çıkıştan sonra,gerçek 4-5 yaprak döneminde	-	100-150 cc.
Bağ	1.Uygulama:Sürgünler 8-10 cm iken 2.Uygulama:Salkım uzama dönemi 3.Uygulama:Meyve bağlandıktan sonra	1-2 lt/Da.	150-250 cc.
Ayçiçeği	Çiçeklenme başlangıcından önce,İç doldurma dönemi	1-2 lt/Da.	75-100 cc.
Muz	Tüm periyodu boyunca 15 gün ara ile	1-2 lt/Da.	200-250 cc.
Tahıllarda(Arpa,Buğday vb)	Kardeşlenme öncesinde	1-2 lt/Da.	100-150 cc.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Organik Madde	%30
Organik Karbon	%13
Organik Azot	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	%1
pH	4-6

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Toprağın işlenmesi, zenginliği, bereketi organik maddeye bağlıdır. Gübreden daha önemli olmasına rağmen, gübre kadar kıymet verilmez. Organik madde yetersizliği, toprağın küme yapıdan tek sel yapıya geçişini hızlandırmakta, havalanma, ısınma, su emme kapasitesi başta olmak üzere birçok özelliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sulanan alanlarda organik madde yetersizliği daha belirgindir ve daha önemli sorunlara neden olmaktadır.

Organik madde öncelikle kil, silt ve kum taneciklerinin bir araya gelerek toprağın küme yapı (agregat) oluşturmalarını sağlamaktadır. Küme yapıda, organik maddece zengin olan topraklar, iyi havalanmakta, ilkbaharda daha çabuk ısınmaktadır.

Havalanma kapasitesinin artması etkili kök derinliğini artırmakta, bitkiler daha geniş toprak kitlesinden yararlanabilmektedir. Daha derinlere inen kökleri sayesinde kuraklığa daha fazla dayanabilmektedirler.

Toprakta organik madde, toprağın su infiltrasyon (su emme) kapasitesini artırdığı gibi, su tutma kapasitesini de artırmaktadır. Daha uzun süre tutulan tarla kapasitesindeki su, bitki besin maddelerinin yayılgılığını bir kat daha artırmaktadır.

Organik maddece fakir topraklarda, yetersiz havalanma nedeniyle kökler toprağın üst kısımlarında yoğunlaşmakta, daha fazla gübre ve sık sık sulamaya gereksinim göstermektedir. İşlemesi zorlaşmakta, sürekli kesek oluşturmaktadır.

MATRIX ile ;

Üretilen ürünün kalite ve miktarı artar.

Bitkinin büyüme hızını artar. Böylelikle bitkinin erken ürün vermesini sağlar.

MATRIX içinde bulunan toprak için gerekli mineraller sayesinde de toprağı verimli hale getirir.

Bitkinin ve Toprağın susuzluğa karşı direcini artırır.

Bitki suya daha az gereksinim duyar. Sulama konusunda gereksiz su harcamasının önüne geçilir.

Toprağın rengini koyulaşır toprağın daha fazla güneş ışığını emmesi sağlanır.

Toprağın geçirgenliğini artırarak hava ve su alımını kolaylaştırır.

Toprağı verilen azot miktarının bitkiye dengeli bir biçimde dağıtır.

Suyun eritemediğı kireci eritir ve eritme sonucu çıkan karbondioksiti fotosentezde kullanılır.

Toprakta bulunan tuzu bitkinin kök kısmından uzaklaştırarak bitkiye zarar vermesini engeller.

Toprakta bulunan bitki gelişimi için gerekli olan demiri bitkinin alabileceğı şekle dönüştürür.

Bitkide hücre bölünmesini artırarak bitkinin büyüme hızını artırır.

MATRIX, Bütün bitki sağlığı ürünleri , gelişim düzenleyicileri ve gübreler ile karışım halinde güvenle kullanılır.

Alkali ürünlerle , yağ, sülfür, bakır ve bakırlı ürünlerle karıştırmayınız.



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZLARI

ÜRÜNLER	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ZAMANI
MEYVE AĞAÇLARI	150 cc / 100 lt su	Sürgün Başlangıcı
SERA BİTKİLERİ	200 cc / da	Fide Dikiminden Sonra 2-3 Hafta Ara İle
TURUNÇGİLLER	150 cc / 100 lt su	Vegetasyon Süresince 4-5 Uygulama
BAĞ	100 cc / da	Sürgün Başlangıcı Çiçeklenme Öncesi ve Sonrası
SEBZELER	200 cc / da	Fide Dikiminden Sonra 2-3 Hafta Ara İle
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	150 cc / da	4-5 Yapraklı Dönemden İtibaren 15 Gün bir Uygulama
PATATES SOĞAN	200 cc / da	1.Uygulama Gelişme Dönemi 2.Uygulama Çapadan Sonra

DAMLAMADAN UYGULAMA DOZU VE ZAMANI


SEBZELER	2,5 lt / da	15 Günde Bir
MEYVE VE BAĞ	2,5 lt / da	15 Günde Bir



İnorganik Sıvı Gübreler

GELECEĞİ
BİLİM
İLE
YEŞERTİYORUZ





GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%7

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Nanoplant Zn, bitkilerde mangan ve çinko eksiliğini önlemek için hazırlanmış sıvı mikroelement karışımıdır.

Nanoplant Zn, meyve silme dönemleri öncesi kullanılması bu problemin oluşmasını engeller.

Nanoplant Zn, kullanıldığı bitkilerde klorofil oluşumunu artırır. Bu sayede besin maddelerinin ,proteinlerin,şekerlerin ve organik asitlerin üretimini artırır.

Nanoplant Zn, çiçeklenme öncesi kullanıldığında meyve tutumunu artırır.


Meyve gelişim döneminde kullanıldığında meyve kalitesi artar.

Nanoplant Zn, özel formülasyonu sayesinde meyvelerde renklenmeyi,albeniyi ve kaliteyi artırır.

Alkali ürünlerle yağ,sülfür,bakır ve bakırlı ürünlerle karıştırmayınız.

Karışım öncesi test edilmesi tavsiye edilir.





BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN (Damlama sulama ile)	YAPRAKTAN UYGULAMA
Domates,Biber,Karpuz,Hıyar vb.	Vegasyon süresince 1-2 defa	300-500 cc/Da	100 Litre Suya 150 ml
Narenciye,Elma,Armut vb.	Vegasyon süresince 2-3 defa	300-500 cc/Da	100 Litre Suya 150 ml
Kayısı,Şeftali,Elma,Armut,Kiraz,Erik,Zeytin vb.	Vegasyon süresince 2-3 defa	300-500 cc/Da	100 Litre Suya 150 ml
Tahıllar	Kardeşlenme başlangıcı,başak oluşumundan önce	300-500 cc/Da	100 Litre Suya 100 ml
Pamuk	Tarak oluşumu,çiçek başlangıcı,koza tutumu dönemlerinde	300-500 cc/Da	100 Litre Suya 100 ml
Mısır	15-30 cm olduğu zamana kadar 1-2 uygulama	300-500 cc/Da	100 Litre Suya 100 ml
Şekerpancarı,Turp,Patates,Soğan,Havuç	Yeşil aksam oluşumundan yumru büyüme dönemi 2-3 uygulama	300-500 cc/Da	100 Litre Suya 150 ml
Soya,Fasulye,Nohut,Mercimek,Yer fıstığı vb.	1.uygulama:2-4 yapraklı iken 2. uygulama:çiçek başlangıcı 3. uygulama:meyve tutumu	300-500 cc/Da	100 Litre Suya 150 ml

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%6

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Bitkilerde bakır noksanlığını giderirken kuvvetli fungusitlik özellikleri sayesinde mantari hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahiptir.

Özel formülasyonunda bakırın dışında bulunan fosfit sayesinde sistemik fungusitlik özellikleri gösterir.

Toprak kökenli fungusları baskı altında tutar.Kök bölgesinde yara patojenlerinin bitki bünyesine nüfuz etmesine izin vermez.


Yaprak ve toprak uygulamaları için üretilmiştir.

Bitkilerin klorofil kapsamalarını artırır,klorofilin parçalanmasını da önler.

Bu sayede bitkilerin gençlik ve tazelik dönemlerini uzatır.

Bitkilerin verimlilik süresini uzatır.





BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN (Damlama sulama ile)	YAPRAKTAN UYGULAMA
Domates ,Biber,Karpuz,Hıyar vb.	Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama	0,5-1 lt / Da	100 Litre Suya 50-100 ml
Narenciye	Çiçek öncesi meyve oluşumundan sonra 1-2 uygulama	0,5-1 lt / Da	100 Litre Suya 100 ml
Kayısı,Şeftali,Elma,Armut,Kiraz,Erik,Zeytin vb.	Çiçek öncesi meyve oluşumundan sonra 1-2 uygulama	0,5-1 lt / Da	100 Litre Suya 50-75 ml
Tarla Bitkileri	Çiçekten 10 gün önce ve devamında 2-3 hafta arayla 1-2 uygulama	0,5-1 lt / Da	100 Litre Suya 75 ml
Pamuk	Bitki 5-6 yapraklı olunca 1 uygulama	0,5-1 lt / Da	100 Litre Suya 100 ml
Üzüm	Çiçek öncesi 1 uygulama,meyve tutumundan sonra 2 uygulama	0,5-1 lt / Da	100 Litre Suya 100 ml
Şekerpancarı,Turp,Patates,Soğan,Havuç	4-5 yapraklı dönemden başlanarak 2-3 uygulama	0,5-1 lt / Da	100 Litre Suya 100 ml

MICROFERT NiSolCa

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot	%8
Nitrat Azotu	%8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(CaO)	15,2

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Microfert NiSolCa; her türlü mahsülünüzde kalsiyum noksanlığını gidermek için hazırlanmış özel bir üründür.

Microfert NiSolCa; uygulaması sürgün faaliyeti ve vegetatif gelişme devam ettiği sürece 15-20 gün aralıklarla tekrar edilmelidir.

Microfert NiSolCa; özel formülasyonu sayesinde bitki bünyesine çok hızlı nüfus eder.

Microfert NiSolCa; Kuraklık ve don stresine karşı bitkilerin dirençli olmasını sağlar.

Microfert NiSolCa; kullanıldığı bitkilerde hücre duvarının kalınlaşmasını sağlar.Meyvelerin çatlama riskini azaltır. Depolama ve raf ömrünü artırır.


Microfert NiSolCa; noksanlık belirtileri görülmeden önce kullanılmalıdır.

Acı benek ve çiçek burnu çürüklüğüne engel olur.

Alkali ürünlerle,yağ,sülfür,bakır ve bakırlı ürünlerle karıştırmayınız.

Karışım öncesi test edilmesi tavsiye edilir





BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN (Damlama sulama ile)	YAPRAKTAN UYGULAMA
Domates,Biber,Patlıcan	İkinci Döl Çiçekler Başladıktan sonar 10 gün ara ile 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suya 250-300 ml
Elma,Armut	Meyve Tutumunda Meyve Oluşumunda 7-10 gün ara ile	1-2 lt / Da	100 Litre Suya 300-350 ml
Patates	Yumru Oluşumundan Sonra 10 gün ara ile 3 defa	1-2 lt / Da	100 Litre Suya 300 ml
Taş Çekirdekli Meyveler	Meyve Tutumunda Meyve Oluşumunda	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suya 300-350 ml

FORCE K 5-0-25+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot	%5
Üre Azotu	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	%25
Suda Çözünür Bor(B)	%0,2

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Kullanılan bitkilerde fotosentez ile üretilen besin maddelerinin taşınımı ve meyvede depolanmasında büyük artışlar görülür.
Meyve renklenmesinde, yağ oranının artmasında, kuru madde (brix) oranının artmasında, antonsiyanların (aromatik özelliklerin) artmasında önemli rol oynar.
Bitkilerde stres (Sıcak, Soğuk, Kuraklık, Don...vb.) koşullarına karşı dirençli olmasını sağlar.
Kullanıldığı bitkiler boğum araları dar daha kompakt yapılı olur.
Depolama ve raf ömrü uzar.
Zor şartlarda kökler tarafından yüksek oranda alınabilirliğe sahiptir.
Yapraktan uygulanabildiği gibi topraktanda uygulanabilir.
Bitki sağlığı ürünleri ile gübreler ve bitki gelişim düzenleyicileri ile karışım halinde güvenle kullanılır.



KULLANIM DOZU VE ZAMANI

ÜRÜN	KULLANIM DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMASI (100 LT)	DAMLAMA UYGULAMASI (Da)
SEBZE	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
MEYVE	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
PATATES	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
SOĞAN	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
Ş. PANCARI	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
TARLA BİTKİLERİ	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
FASULYE	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
PAMUK	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
YER FISTIĞI	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)
BAĞ	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	150-200 cc (lt)	2-2,5 lt (da)



GREEN POINT 3-15-0+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot	%3
Üre Azotu	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)	%15
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%5

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Azot ,Fosfor ve Çinko'yu bitkilerin istediği en ideal form ve oranlarda bünyesinde bulundurur.

Bitkide çift yönlü hareket eden bir üründür. Hem yapraktan hemde topraktan kullanılabilir.

Kök yüzeyinin ve hacminin artmasını sağlar. Bitkilerde köklenmeyi teşvik etmek istediğiniz, generatif döneme döndürmek istediğiniz (çiçeklenme, meyve bağlama..) dönemlerin gübresidir.

Tek ve çok yıllık bitkilerde vegetatif gelişmenin hızlı olduğu aynı zamanda da generatif döneme zorlamak istediğiniz dönemlerde kullanılan bir gübredir.





ÜRÜN	KULLANIM DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMASI (100 LT)	DAMLAMA UYGULAMASI (Da)
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, çilek vb)	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonrabaslayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama yapılır	1-2 lt / Da	100 Litre Suya 200–250 ml
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suya 200–250 ml
YUMRULU BİTKİLER (Şekerpancarı, Patates, Kereviz, v.b) Soğan, Sarımsak	Çapadan sonra bir uygulama 15-20 gün sonra ikinci uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suya 200–250 ml
Kavun, Karpuz, Kabak	Kol atımında, meyve tutumunda 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suya 200–250 ml
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık vb)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suya 250–300 ml
Avakado	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suya 250–300 ml
Muz	Fide dikiminden bir ay sonra başlayarak doğuma kadar 3-4	1-2 lt / Da	100 Litre Suya 250–300 ml
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği vb)	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2-3 uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya vb)	Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb)	Kardeşlenme ve sapa kalkmadöneminde iki uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar



Jel Ve Süspansiyon Gübreler

GELECEĞİ
BİLİM
İLE
YEŞERTİYORUZ





GREEN POINT 7-7-7

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot(N)	%7
Üre Azotu(NH ₂ -N)	%7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	%7
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	%7

GREEN POINT SERİSİ

GREEN POINT, Yüksek safiyette Azot – Fosfor - Potasyum ve Fosfor - Potasyum içeren, suda %100 çözünebilen NPK damla sulama gübresidir.

Zor şartlarda kökler tarafında yüksek alınabilirliğe sahiptir.

GREEN POINT , Toprakta tuzluluk yaratmaz. Toprak çözeltisindeki tuz konsantrasyonunun artması toprak çözeltisinin ozmotik basıncını artırır.

Buda toprakta su bulunmasına rağmen bitkinin suyu alamamasına hatta bitki köklerinden toprağa su geçişine neden olur. Toprak çözeltisinin iyon dengesi bozulur. Yüksek pH düzeylerinde bazı bitki besin elementlerinin çözünürlüğü ve elverişliliği azalır. Beslenme bozuklukları başlar. Özellikle sodyum un dispers edici etkisi nedeniyle toprak sütrüktürünün bozulmasına ve altta geçirimsiz bir katman oluşumuna neden olur. Topraktaki olumsuz koşullar toprak canlılarını olumsuz yönde etkiler, buda dolaylı olarak toprağın kültür bitkileri için istenmeyen koşullara sahip olmasına yol açar.

Uygulama kolaylığı; Damla sulama sistemleri , Yağmurlama sulama sistemleri, Salma ile uygulama kolaylığı.





BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN (Damlama sulama ile)	YAPRAKTAN UYGULAMA
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, çilek vb)	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama yapılır	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
YUMRULU BİTKİLER (Şekerpancarı, Patates, v.b) Soğan, Sarımsak	Çapa dan sonra bir uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
Kavun, Karpuz, Kabak,	Kol atımında, meyve tutumunda 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık vb)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
Avakado	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
Muz	Fide dikiminden bir ay sonra başlayarak doğuma kadar 3-4	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği vb)	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2-3 uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya vb)	Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb)	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde iki uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar

GREEN POINT 0-15-20

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)	%15
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)	%20

GREEN POINT SERİSİ

GREEN POINT, Yüksek safiyette Azot – Fosfor - Potasyum ve Fosfor - Potasyum içeren, suda %100 çözünebilen NPK damla sulama gübresidir.

Zor şartlarda kökler tarafında yüksek alınabilirliğe sahiptir.

GREEN POINT , Toprakta tuzluluk yaratmaz. Toprak çözeltisindeki tuz konsantrasyonunun artması toprak çözeltisinin ozmotik basıncını artırır.

Buda toprakta su bulunmasına rağmen bitkinin suyu alamamasına hatta bitki köklerinden toprağa su geçişine neden olur. Toprak çözeltisinin iyon dengesi bozulur. Yüksek pH düzeylerinde bazı bitki besin elementlerinin çözünürlüğü ve elverişliliği azalır. Beslenme bozuklukları başlar. Özellikle sodyum un dispers edici etkisi nedeniyle toprak sütrüktürünün bozulmasına ve altta geçirimsiz bir katman oluşumuna neden olur. Topraktaki olumsuz koşullar toprak canlılarını olumsuz yönde etkiler, buda dolaylı olarak toprağın kültür bitkileri için istenmeyen koşullara sahip olmasına yol açar.

Uygulama kolaylığı; Damla sulama sistemleri , Yağmurlama sulama sistemleri, Salma ile uygulama kolaylığı.





KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN (Damlama sulama ile)	YAPRAKTAN UYGULAMA
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, çilek vb)	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak mey ve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama yapılır	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
YAPRAĞIYENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
YUMRULU BİTKİLER (Şeker pancarı, Patates, v.b) Soğan, Sarımsak	Çapadan sonra bir uygulama 15-20 gün sonra ikinci uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
Kavun, Karpuz, Kabak,	Kol atımında, meyve tutumunda 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık vb)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
Avakado	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
Muz	Fide dikiminden bir ay sonra başlayarak doğuma kadar 3-4	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği vb)	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2-3 uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya vb)	Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb)	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde iki uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar



GREEN POINT 6-3-24

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot(N)	%6
Üre Azotu(NH ₂ -N)	%6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	%24

GREEN POINT SERİSİ

GREEN POINT, Yüksek safiyette Azot – Fosfor - Potasyum ve Fosfor - Potasyum içeren, suda %100 çözünebilir NPK damla sulama gübresidir.

Zor şartlarda kökler tarafında yüksek alınabilirliğe sahiptir.

GREEN POINT , Toprakta tuzluluk yaratmaz. Toprak çözeltisindeki tuz konsantrasyonunun artması toprak çözeltisinin ozmotik basıncını artırır.

Buda toprakta su bulunmasına rağmen bitkinin suyu alamamasına hatta bitki köklerinden toprağa su geçişine neden olur. Toprak çözeltisinin iyon dengesi bozulur. Yüksek pH düzeylerinde bazı bitki besin elementlerinin çözünürlüğü ve elverişliliği azalır. Beslenme bozuklukları başlar. Özellikle sodyum un dispers edici etkisi nedeniyle toprak sütrüktürünün bozulmasına ve altta geçirimsiz bir katman oluşumuna neden olur. Topraktaki olumsuz koşullar toprak canlılarını olumsuz yönde etkiler, buda dolaylı olarak toprağın kültür bitkileri için istenmeyen koşullara sahip olmasına yol açar.

Uygulama kolaylığı; Damla sulama sistemleri , Yağmurlama sulama sistemleri, Salma ile uygulama kolaylığı.






BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN (Damlama sulama ile)	YAPRAKTAN UYGULAMA
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, çilek vb)	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama yapılır	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
YUMRULU BİTKİLER (Şekerpancarı, Patates, v.b) Soğan, Sarımsak	Çapadan sonra bir uygulama 15-20 gün sonra ikinci uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
Kavun, Karpuz, Kabak,	Kol atımında, meyve tutumunda 3-4 uygulama	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 200-250 ml
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turuncgiller, Zeytin, Bağ, Fındık vb)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
Avakado	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	2-2,5 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
Muz	Fide dikiminden bir ay sonra başlayarak doğuma kadar 3-4	1-2 lt / Da	100 Litre Suyu 250-300 ml
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği vb)	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2-3 uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya vb)	Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb)	Kardeşlenme ve sap kalkma döneminde iki uygulama	1-2 lt / Da	150-200 ml/dekar



Damlama Ve Sulama Gübreleri

GELECEĞİ
BİLİM
İLE
YEŞERTİYORUZ







GROWCARE 4-18-17+(4MgO)+(22SO3)+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot(N)	%4
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%17
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%18
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%22
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%4
Suda Çözünür Bor(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,03
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,1
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,5
Suda Çözünür Molibden(Mo)	%0,002
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02

GrowCare Serisi

GrowCare, sodyum ve klor içermez. Toprakta tuzluluk yaratmaz. Toprak çözeltisindeki tuz konsantrasyonunun artması toprak çözeltisinin ozmotik basıncını artırır. Buda toprakta su bulunmasına rağmen bitkinin suyu alamamasına hatta bitki köklerinden toprağa su geçişine neden olur. Toprak çözeltisinin iyon dengesi bozulur. Yüksek pH düzeylerinde bazı bitki besin elementlerinin çözünürlüğü ve elverişliliği azalır. Beslenme bozuklukları başlar. Özellikle sodyum un dispers edici etkisi nedeniyle toprak sütrüktürünün bozulmasına ve altta geçirimsiz bir katman oluşumuna neden olur. Topraktaki olumsuz koşullar toprak canlılarını olumsuz yönde etkiler, buda dolaylı olarak toprağın kültür bitkileri için istenmeyen koşullara sahip olmasına yol açar.

GrowCare, Azot, Fosfor, Potasyum'un yanında yüksek oranda Kükürt (SO₃) ve Magnezyum içeren, suda %100 çözünebilir NPK damla sulama gübresidir. Mikro elementlerce zenginleştirilmiştir. Zor şartlarda kökler tarafında yüksek alınabilirliğe sahiptir.

GrowCare, yüksek oranda Magnezyum, Kükürt ve İz elementler içerir. Sağlıklı koyu renkli bir yeşil aksamın oluşmasında klorofil oluşum hızı çok önemlidir.

Her klorofil molekülünün oluşması için bir molekül Magnezyuma ihtiyaç vardır. Kükürt ve İz elementler bitkilerde Klorofil oluşumunu arttırırken toprağın fiziksel yapısını da iyileştirir. Bitkilerde Klorofil miktarının artması beslenme düzeyini ve büyümeyi arttırır.

Azot, Fosfor ve Potasyum'un yanında yüksek oranda Kükürt (SO₃), Magnezyum içeren suda %100 çözünebilir NPK damla sulama gübresidir.

Mikro elementlerce zenginleştirilmiştir.

Zor şartlarda kökler tarafında yüksek oranda alınabilirliğe sahiptir.

Sodyum ve Klor içermez





KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTAR:

Kullanım Alanı	Kullanım Zamanı	Sulama Suyu ile Uygulama	Yapraktan Uygulama
Açık ve Örtü Altı Sebzeler	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 3 -4 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Gözlerin uyanması ile birlikte hasada kadar 2-3 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Bağ	Sürgün faaliyeti başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönem.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Ayçiçeği, Mısır..	Tohum ekiminden 20 gün sonra başlanır 90-100. Güne kadar 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 350-500 Gr.
Pamuk	Taraklanma başlangıcından itibaren koza şişirme dönemine kadar 2-3 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 500-750 Gr.
Şekerpancarı, Havuç, Soğan, Yerkıstığı...	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca 2. Çapadan sonra 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da. salma suyu ile birlikte	100 lt Suyu 350-500 Gr.
Yem Bitkileri	Her biçimden sonra	3-4 kg./da.	100 lt Suyu 500-600 Gr.
Kavun, Karpuz, Çilek	Kol atma döneminden önce başlanır 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Antep Fıstığı	Çiçek başlangıcından meyve bağlama dönemine kadar 3-4 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Fındık	Çiçeklenme öncesine başlanır 15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Zeytin	Çiçek somak başlangıcından itibaren meyve şişirme dönemi sonuna kadar 4-5 uygulama	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Lahana , Karnıbahar	Dikimden 4-5 hafta sonra başlanır 10 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Patates	Sap uzaması, tomurcuk ve çiçek dönemlerinde 3 uygulama yapılır.	1-2 kg./da. Sulama suyu ile birlikte	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Narenciye	Çiçeklenme öncesine başlanır hasat dönemine kadar ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Enginar	Uyandırma döneminden itibaren 8-10 gün aralarla 4-5 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Kesme Çiçekler	Vegetatif gelişme öncesine başlanır ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Çilek	Çiçeklenme öncesine başlanır 7 gün ara ile uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Muz	İhtiyaç duyulan her dönem	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden 20 gün sonra 15 gün ara ile sezon boyunca uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 350-500 Gr.



GROWCARE 10-7-17+(6MgO)+(25SO3)+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot(N)	%10
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%1,5
Üre Azotu(NH ₂ -N)	%8,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%17
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%7
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%25
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%6
Suda Çözünür Bor(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,03
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,1
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,5
Suda Çözünür Molibden(Mo)	%0,002
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02





KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTAR:

Kullanım Alanı	Kullanım Zamanı	Sulama Suyu ile Uygulama	Yapraktan Uygulama
Açık ve Örtü Altı Sebzeler	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Gözlerin uyanması ile birlikte hasada kadar 2-3 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Bağ	Sürgün faaliyeti başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönem.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Ayçiçeği, Mısır..	Tohum ekiminden 20 gün sonra başlanır 90-100. Güne kadar 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 350-500 Gr.
Pamuk	Taraklanma başlangıcından itibaren koza şişirme dönemine kadar 2-3 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 500-750 Gr.
Şekerpancarı, Havuç, Soğan, Yerkıstığı...	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca 2. Çapadan sonra 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da. sulama suyu ile birlikte	100 lt Suyu 350-500 Gr.
Yem Bitkileri	Her biçimden sonra	3-4 kg./da.	100 lt Suyu 500-600 Gr.
Kavun, Karpuz, Çilek	Kol atma döneminden önce başlanır 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Antep Fıstığı	Çiçek başlangıcından meyve bağlama dönemine kadar 3-4 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Fındık	Çiçeklenme öncesi başlanır 15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Zeytin	Çiçek somak başlangıcından itibaren meyve şişirme dönemi sonuna kadar 4-5 uygulama	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Lahana, Karnıbahar	Dikimden 4-5 hafta sonra başlanır 10 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Patates	Sap uzaması, tomurcuk ve çiçek dönemlerinde 3 uygulama yapılır.	1-2 kg./da. Sulama suyu ile birlikte	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Narenciye	Çiçeklenme öncesi başlanır hasat dönemine kadar ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Enginar	Uyandırma döneminden itibaren 8-10 gün aralarla 4-5 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Kesme Çiçekler	Vegetatif gelişme öncesi başlanır ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Çilek	Çiçeklenme öncesi başlanır 7 gün ara ile uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Muz	İhtiyaç duyulan her dönem	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden 20 gün sonra 15 gün ara ile sezon boyunca uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 350-500 Gr.

GROWCARE 13-13-13+(5MgO)+(20SO3)+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot(N)	%13
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%2,5
Üre Azotu(NH ₂ -N)	%10,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%13
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%13
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%20
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%5
Suda Çözünür Bor(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,03
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,1
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,5
Suda Çözünür Molibden(Mo)	%0,002
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02





KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTAR:

Kullanım Alanı	Kullanım Zamanı	Sulama Suyu ile Uygulama	Yapraktan Uygulama
Açık ve Örtü Altı Sebzeler	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 3 -4 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Cözlerin uyanması ile birlikte hasada kadar 2-3 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Bağ	Sürgün faaliyeti başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönem.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Ayçiçeği, Mısır..	Tohum ekiminden 20 gün sonra başlanır 90-100. Güne kadar 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 350-500 Gr.
Pamuk	Taraklanma başlangıcından itibaren koza şişirme dönemine kadar 2-3 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 500-750 Gr.
Şekerpancarı, Havuç, Soğan, Yerfıstığı...	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca 2. Çapadan sonra 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da.salma suyu ile birlikte	100 lt Suya 350-500 Gr.
Yem Bitkileri	Her biçimden sonra	3-4 kg./da.	100 lt Suya 500-600 Gr.
Kavun, Karpuz, Çilek	Kol atma döneminden önce başlanır 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Antep Fıstığı	Çiçek başlangıcından meyve bağlama dönemine kadar 3-4 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Fındık	Çiçeklenme öncesi başlanır 15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Zeytin	Çiçek somak başlangıcından itibaren meyve şişirme dönemi sonuna kadar 4-5 uygulama	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Lahana , Karnıbahar	Dikimden 4-5 hafta sonra başlanır 10 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Patates	Sap uzaması,tomurcuk ve çiçek dönemlerinde 3 uygulama yapılır.	1-2 kg./da. Sulama suyu ile birlikte	100 lt Suya 250-300 Gr.
Narenciye	Çiçeklenme öncesi başlanır hasat dönemine kadar ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.	100 lt Suya 250-300 Gr.
Enginar	Uyandırma döneminden itibaren 8-10 gün aralarla 4-5 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Kesme Çiçekler	Vegetatif gelişme öncesi başlanır ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Çilek	Çiçeklenme öncesi başlanır 7 gün ara ile uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden 20 gün sonra 15 gün ara ile sezon boyunca uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 350-500 Gr.



GROWCARE 4-0-22+(6MgO)+(30SO3)+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot(N)	%4
Üre Azotu(NH ₂ -N)	%4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%22
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	%30
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%6
Suda Çözünür Bor(B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%0,03
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,1
Suda Çözünür Demir(Fe)	%0,5
Suda Çözünür Molibden(Mo)	%0,002
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,02





KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTAR:

Kullanım Alanı	Kullanım Zamanı	Sulama Suyu ile Uygulama	Yapraktan Uygulama
Açık ve Örtü Altı Sebzeler	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 3 -4 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Gözlerin uyanması ile birlikte hasada kadar 2-3 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Bağ	Sürgün faaliyeti başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönem.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Ayçiçeği, Mısır..	Tohum ekiminden 20 gün sonra başlanır 90-100. Güne kadar 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 350-500 Gr.
Pamuk	Taraklanma başlangıcından itibaren koza şişirme dönemine kadar 2-3 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 500-750 Gr.
Şekerpancarı, Havuç, Soğan, Yer Fıstığı...	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca 2. Çapadan sonra 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da. salma suyu ile birlikte	100 lt Suyu 350-500 Gr.
Kavun, Karpuz, Çilek	Kol atma döneminden önce başlanır 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 500-600 Gr.
Zeytin	Çiçek somak başlangıcından itibaren meyve şişirme dönemi sonuna kadar 4-5 uygulama	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Patates	Sap uzaması, tomurcuk ve çiçek dönemlerinde 3 uygulama yapılır.	1-2 kg./da. Sulama suyu ile birlikte	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Narenciye	Çiçeklenme öncesi başlanır hasat dönemine kadar ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Kesme çiçekler	Vegetatif gelişme öncesi başlanır ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Çilek	Çiçeklenme öncesi başlanır 7 gün ara ile uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden 20 gün sonra 15 gün ara ile sezon boyunca uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.



Yaprak Gübreleri

GELECEĞİ
BİLİM
İLE
YEŞERTİYORUZ





GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Suda Çözünür Bor(B)	%30
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%13
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%1

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

MICROLEA; bitkilerde birçok mikro element eksikliğini önlemek ve gidermek için hazırlanmış mikro elementler karışımıdır.

MICROLEA; kullanıldığı bitkilerde klorofil oluşumunu artırır.

MICROLEA; besinmaddelerini, proteinlerin, şekerlerin ve organik asitlerin üretimini artırır.

MICROLEA; çiçekli bitkilerde ve süs bitkilerinde çiçeklenme öncesi kullanıldığında homojen ve çok sayıda çiçeklenme sağlar.

MICROLEA; bitkilerin kuru madde miktarını (Brix) ve koku özelliklerini (Antonsiyanlar) artırır.

MICROLEA; çim alanlarda ezilmeye karşı fiziksel dayanımı artırır.





KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	Yapraktan Uygulama 100 Lt. Suyla	Sulama Suyu İle Uygulama
Tüm Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan, Çilek...vb.)	Çimlenmeden bir hafta sonra İlk çiçeklenme döneminde İlk meyve dökümünden sonra	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Açık Alan Sebzelerde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan, Çilek...vb.)	Çimlenmeden bir hafta sonra İlk çiçeklenme döneminde İlk meyve dökümünden sonra	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Kışkık Sebzelerde (Kıvrıkcık Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana...vb.)	Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Yumrulu Bitkiler (Ş. Pancan Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç...vb.)	Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Kavun, Karpuz, Kabak	Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra, hasattan 30 gün evvel	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Antep Fıstığı	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra, hasattan 30 gün evvel	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Narenciye, Muz İncir, Zeytin	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra, hasattan 30 gün evvel	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Bağlarda ve kesme çiçekler	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra, hasattan 30 gün evvel	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Mısır, Ayçiçeği	1.Uygulama: Ekimden 30 gün sonra. 2.Uygulama:Ürünün içine girilebilecek son dönemde	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Pamuk	Taraklanma başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönemde ve sıklıkta.	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Endüstri Bitkileri (Soya, Yer Fıstığı, Kanola...vb.)	3-5 Yapraklı dönemden sonra ihtiyaç duyulan her dönem ve sıklıkta .	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik v.b) ve Yeşil Alanlar	Bitkiler 20-25 cm olunca Süt olum döneminde	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.



HARMONİ 10-40-10+(2MgO)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot(N)	%10
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%7
Nitrat Azotu(NO ₃ -N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%2
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,08
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,09


ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Harmoni 10-40-10+(2MgO)+TE ultra kalite ve saflıkta hammaddelerden oluşan suda çözünür bir gübredir.

Fosfor ağırlıklı bu formülasyon sayesinde bitki, vejetasyon başından itibaren ihtiyaç duyduğu fosforu en uygun formda ve optimum seviyede almış olur.

Vejetatif gelişimin başında ihtiyaç duyulan azot, hızlı etki eden formu sayesinde bitkiye en kısa sürede sağlanmış olur.





KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTAR:

Kullanım Alanı	Kullanım Zamanı	Sulama Suyu ile Uygulama	Yapraktan Uygulama
Açık ve Örtü Altı Sebzeler	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Gözlerin uyanması ile birlikte hasada kadar 2-3 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Bağ	Sürgün faaliyeti başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönem.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Ayçiçeği, Mısır..	Tohum ekiminden 20 gün sonra başlanır 90-100. Güne kadar 3-4 uygulama yapılır	-----	100 lt Suya 350-500 Gr.
Pamuk	Taraklanma başlangıcından itibaren koza şişirme dönemine kadar 2-3 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 500-750 Gr.
Şekerpancarı, Havuç, Soğan, Yerkıstığı...	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca 2. Çapadan sonra 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da. salma suyu ile birlikte	100 lt Suya 350-500 Gr.
Yem Bitkileri	Her biçimden sonra	3-4 kg./da.	100 lt Suya 500-600 Gr.
Kavun, Karpuz, Çilek	Kol atma döneminden önce başlanır 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Antep Fıstığı	Çiçek başlangıcından meyve bağlama dönemine kadar 3-4 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Fındık	Çiçeklenme öncesibaşlanır 15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Zeytin	Çiçek somak başlangıcından itibaren meyve şişirme dönemi sonuna kadar 4-5 uygulama	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Lahana , Karmıbahar	Dikimden 4-5 hafta sonra başlanır 10 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Patates	Sap uzaması,tomurcuk ve çiçek dönemlerinde 3 uygulama yapılır.	1-2 kg./da. Sulama suyu ile birlikte	100 lt Suya 250-300 Gr.
Narenciye	Çiçeklenme öncesibaşlanır hasat dönemine kadar ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.	100 lt Suya 250-300 Gr.
Enginar	Uyandırma döneminden itibaren 8-10 gün aralarla 4-5 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Kesme Çiçekçilik	Vegetatif gelişme öncesibaşlanır ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Çilek	Çiçeklenme öncesibaşlanır 7 gün ara ile uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Muz	İhtiyaç duyulan her dönem	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden 20 gün sonra 15 gün ara ile sezon boyunca uygulamaya devam edilir.	-----	100 lt Suya 350-500 Gr.

HARMONİ 30-10-10+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Azot(N)	%10
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%4
Nitrat Azotu(NO ₃ -N)	%3
Üre Azotu(NH ₂ -N)	%23
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%10
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%10
Suda Çözünür Bor(B)	%0,04
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%0,08
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%0,09

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Harmoni 30-10-10+TE yüksek azot içerikli ürünümüz; bitkinin azot ihtiyacını vejetatif gelişim süresince karşılamak için önerilen bir gübredir. Mikro besinler ile beraber istenildiğinde yapraktan ve damlamadan uygulama için de uygundur. Yüksek azot içeriği göz önüne alındığında; bitkilerin erken evrelerinde, çiçeklenme ve meyve öncesi dönemlerde Harmoni 30-10-10+TE gübremizi kullanmanızı tavsiye ederiz





KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTAR:

Kullanım Alanı	Kullanım Zamanı	Sulama Suyu ile Uygulama	Yapraktan Uygulama
Açık ve Örtü Altı Sebzeler	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Gözlerin uyanması ile birlikte hasada kadar 2-3 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Bağ	Sürgün faaliyeti başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönem.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Ayçiçeği, Mısır..	Tohum ekiminden 20 gün sonra başlanır 90-100. Güne kadar 3-4 uygulama yapılır	----	100 lt Suya 350-500 Gr.
Pamuk	Tarakanma başlangıcından itibaren koza şişirme dönemine kadar 2-3 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 500-750 Gr.
Şekerpancarı, Havuç, Soğan, Yerfıstığı...	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca 2. Çapadan sonra 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama	1,5-2 kg./da. salma suyu ile birlikte	100 lt Suya 350-500 Gr.
Yem Bitkileri	Her biçimden sonra	3-4 kg./da.	100 lt Suya 500-600 Gr.
Kavun, Karpuz, Çilek	Kol atma döneminden önce başlanır 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Antep Fıstığı	Çiçek başlangıcından meyve bağlama dönemine kadar 3-4 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Fındık	Çiçeklenme öncesi başlanır 15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Zeytin	Çiçek somak başlangıcından itibaren meyve şişirme dönemi sonuna kadar 4-5 uygulama	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Lahana, Karnıbahar	Dikimden 4-5 hafta sonra başlanır 10 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Patates	Sap uzaması, tomurcuk ve çiçek dönemlerinde 3 uygulama yapılır.	1-2 kg./da. Sulama suyu ile birlikte	100 lt Suya 250-300 Gr.
Narenciye	Çiçeklenme öncesi başlanır hasat dönemine kadar ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.	100 lt Suya 250-300 Gr.
Enginar	Uyandırma döneminden itibaren 8-10 gün aralarla 4-5 uygulama yapılır.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Kesme Çiçekçilik	Vegetatif gelişme öncesi başlanır ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Çilek	Çiçeklenme öncesi başlanır 7 gün ara ile uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Muz	İhtiyaç duyulan her dönem	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suya 250-300 Gr.
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden 20 gün sonra 15 gün ara ile sezon boyunca uygulamaya devam edilir.	----	100 lt Suya 350-500 Gr.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Suda Çözünür Bor(B)	%2
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%2
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%8
Suda Çözünür Demir(Fe)	%4
Suda Çözünür Molibden(Mo)	%0,01
Suda Çözünür Bakır(Cu)	%1

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

ORIEN Combi, bitkilerde birçok mikro element eksikliğini önlemek ve gidermek için hazırlanmış mikroelementler karışımıdır.

ORIEN Combi, kullanıldığı bitkilerde klorofil oluşumunu artırır.

Bu sayede besin maddelerini, proteinlerin, şekerlerin ve organik asitlerin üretimini artırır.

ORIEN Combi, çiçeklenme öncesi kullanıldığında meyve tutumunu artırır.

Meyve gelişim döneminde kullanıldığında meyve kalitesi artar.

Bitkilerin ve meyvelerin kuru madde miktarını (Brix) ve aromatik özelliklerini (Antonsiyanlar) artırır.

ORIEN Combi, özel formülasyonu sayesinde meyvelerde renklenmeyi, albeniyi ve kaliteyi artırır. Alkali ürünlerle , yağlı ürünlerle karıştırmayınız.





KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	Yapraktan Uygulama 100 Lt. Suyu	Sulama Suyu ile Uygulama
Tüm Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan, Çilek...vb.)	Çimlenmeden bir hafta sonra İlk çiçeklenme döneminde İlk meyve dökümünden sonra	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Açık Alan Sebzelerde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan, Çilek ..vb.)	Çimlenmeden bir hafta sonra İlk çiçeklenme döneminde İlk meyve dökümünden sonra	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Kışlık Sebzelerde (Kıvrıkcık Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana...vb.)	Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Yumruklu Bitkiler (Ş. Pancarı Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç...vb.)	Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Kavun, Karpuz, Kabak	Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra, hasattan 30 gün evvel	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Antep Fıstığı	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra, hasattan 30 gün evvel	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Narenciye, Muz İncir, Zeytin	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra, hasattan 30 gün evvel	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.
Bağlarda ve kesme çiçekler	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra,	100-150 gr.	0,5-1 Kg. /Da.

GELECEĞİ
BİLİM
İLE
YEŞERTİYORUZ





GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO)	%40
Tane Büyüklüğü	Tamamı <30 mikron
pH	7-9

PÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

ORIEN CalVit , teknolojisinin anahtarı partikül büyüklüğünde saklıdır.

Partikül Büyüklüğü ve Önemi

- Ürün'ün % 98'i 10 µm (Mikron) dur.
- Standard Partikül Büyüklüğündedir.
- Bütün İlaçlama Aletleri İle Atılabilir (Dron, Elektrostatik ve Tijet Memeli İlaçlama Araçları.)

Yaprak Uygulaması İçin Uygundur

- Yaprak Yüzeyine Püskürtüldükten Sonra Gözenekler Tarafından Doğrudan Emilir.
- Bitki Bünyesine Girdikten Sonra Karbondioksit'e dönüşür, Buda Bitkinin Fotosentez Kabiliyetini Arttırır.

- Uygulandığı Ürünlerin Meyve ve Yapraklarında Leke Bırakmaz.

Karışabilirlik; ORIEN CalVit , Pestisitlerin ve Bitki Besleme Ürünlerinin Tümüyle Karışabilmekle birlikte bir ön karışım yapılması UYGUNDUR.





KULLANIM DOZU VE ZAMANI

Bitki Çeşidi	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama
Tarla Bitkileri	1.Uygulama 3-5 Yapraklıyken 15 gün sonra 2.uygulama	250 gr/100 Lt Su
Sera ve Örtü altı Bitkileri	Çiçeğin hemen öncesi ve Çiçekten 10 gün sonra 2 uygulama	200 gr/100 Lt Su
Meyve Ağaçları,Narenciye	1.Uygulama Çiçekten 10 gün önce,Meyveler şekillendiğinde 2. uygulama	300 gr/100 Lt Su
Bağ	1.Uygulama:Çiçeklenmenin hemen ertesi,Meyvalar şekillendiğinde 2. uygulama	250 gr/100 Lt Su
Zeytin	1.Uygulama:Çiçeklenme bitiminde,15 gün sonra 2.uygulama	300 gr/100 Lt Su
Hububat	1.Uygulama:İlk gelişme zamanında,15 gün sonra 2.uygulama	250 gr/100 Lt Su
Tahıllar	1.Uygulama 3-5 yapraklıyken 15 gün sonra 2.uygulama	250gr/100 Lt.su
Kavun Karpuz	1.Uygulama Çiçek öncesi,Meyveler görüldüğünde 2. uygulama	250gr/100Lt su
Zeytin	1.uygulama çiçeklenme ertesi,15 gün sonra 2.uygulama	300gr/100Lt su



ORIENT 0-40-40

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	w/w
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	%40

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

T Fosfor ve Potasyum içeren suda % 100 çözünebilen PK içeren, yaprak ve toprak uygulamaları için geliştirilmiş bir gübredir. Toprakta hareket kabiliyeti ve bitkiler tarafından alınabilirliği çok yüksektir. Bitkide çift yönlü hareket eden bir üründür. Hem yapraktan hemde topraktan kullanılabilir. Tek ve çok yıllık bitkilerde vegetatif gelişmenin hızlı olduğu aynı zamanda da generatif döneme zorlamak istediğiniz dönemlerde kullanılan bir gübredir.





KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTAR:

Kullanım Alanı	Kullanım Zamanı	Sulama Suyu ile Uygulama	Yapraktan Uygulama
Açık ve Örtü Altı Sebzeler	Dikimden itibaren hasat sonuna kadar 3 -4 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.	Gözlerin uyanması ile birlikte hasada kadar 2-3 uygulama.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Bağ	Sürgün faaliyeti başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her dönem.	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Ayçiçeği, Mısır..	Tohum ekiminden 20 gün sonra başlanır 90-100. Güne kadar 3-4 uygulama yapılır	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 350-500 Gr.
Pamuk	Tarakanma başlangıcından itibaren koza şişirme dönemine kadar 2-3 uygulama.	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 500-750 Gr.
Şekerpancarı, Havuç, Soğan, Yer Fıstığı...	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca 2. Çapadan sonra 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama.	1,5-2 kg./da.salma suyu ile birlikte	100 lt Suyu 350-500 Gr.
Kavun, Karpuz, Çilek	Kol atma döneminden önce başlanır 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	2-3 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 500-600 Gr.
Zeytin	Çiçek somak başlangıcından itibaren meyve şişirme dönemi sonuna kadar 4-5 uygulama	1,5-2 kg./da. topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Patates	Sap uzaması,tomurcuk ve çiçek dönemlerinde 3 uygulama yapılır.	1-2 kg./da. Sulama suyu ile birlikte	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Narenciye	Çiçeklenme öncesi başlanır hasat dönemine kadar ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Kesme çiçekler	Vegetatif gelişme öncesi başlanır ihtiyaç duyulan her dönem uygulanır.	2-3 kg./da.topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Çilek	Çiçeklenme öncesi başlanır 7 gün ara ile uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.
Yeşil Alanlar	Tohum ekiminden 20 gün sonra 15 gün ara ile sezon boyunca uygulamaya devam edilir.	1,5-2 kg./da topraktan	100 lt Suyu 250-300 Gr.



